



سازمان دامپزشکی کشور
اداره کل دامپزشکی استان خراسان



سازمان دامپزشکی کشور
اداره کل دامپزشکی استان خراسان

بیماری آنتریتوکسمی

Enterotoxaemia



توجه! توجه! توجه!

بیماری آنتریتوکسمی که به آن بیماری پرخوری یا قلوله نرمی نیز گفته می شود، بیماری خطرناک ناشی از تغییر جیره در نشخوارکنندگان بویژه گوسفند و بز است.

توجه! توجه! توجه!

آیا می دانید؟؟

علائم بیماری:

حیوانات جوان حساس تر بوده و میزان بالای مرگ و میر ناگهانی این بیماری متعلق به بره ها و بزغاله هاست.

در دام های جوان شکل فوق حاد بیماری شایع است که مشخصه آن مرگ ناگهانی ۱۲ ساعت از بروز اولین علائم می باشد. مرگ ناگهانی دقایقی پس از اینکه بره یا بزغاله علائم اختلالات سیستم عصبی مرکزی (شامل هیجان و تشنج) را از خود نشان داد حادث می شود. برخی از علائم مهم این بیماری عبارت است از:

- اسهال
- از دست دادن اشتها
- زمین گیری و ترشح زیاد بزاق و درد ناحیه شکمی

این بیماری بیشتر در فصل بهار و رویش علوفه تازه در اثر تغییر ناگهانی غذای دام ها از علوفه خشک به علوفه تازه بروز می کند. این مختص فصل بهار نیست و در پاییز هم که غذای دام از تازه به خشک تغییر می کند، امکان بروز آن وجود دارد.

تشخیص بیماری: بر اساس علائم بالینی و کالبد شکافی می باشد. در بررسی پس از مرگ روده های بزرگ و کوچک مقادیر فراوانی از خونابه و لخته های فیبروزی، و تعداد زیادی زخم ها مخاطی (در لایه داخلی روده) مشاهده می شود. بافت مغز و کلیه نرم می شود.

پیشگیری از بیماری:

- ♦ واکسیناسیون به موقع دام و قبل از انتقال آن ها به مراتع سرسبز
- ♦ مدیریت تغذیه دام در زمان تغییر خوراک آن ها از علوفه خشک به علوفه تازه
- ♦ جلوگیری از پر خوری دام ها

واکسیناسیون به موقع و مدیریت تغذیه دام ها دو اصل مهم در پیشگیری از بیماری آنتریتوکسمی است.



دامپزشکی در خدمت بهداشت و سلامت جامعه
تلفن ۱۵۱۲ پاسخگوی همیشگی شما